

FLORISTISCHE EN PLANTENSOCIOLOGISCHE BIJZONDERHEDEN

Bij een nauwkeurig onderzoek van de Twentse heide blijken er op de kleine restantjes, die de ontginning als het ware vergeten heeft, soms nog de meest bijzondere planten te groeien. Een treffend voorbeeld daarvan is de Fayersheide ten zuiden van Vriezenveen. Dit is een lange smalle strook heide temidden van hooilanden gelegen. Naar het aspect van de vegetatie zou men hem tot het Callunetum ericetosum kunnen rekenen. De floristische samenstelling wijst echter op het heischrale hooiland (Nardo-Galion), en daarvan de *Botrychium lunaria* - *Polygala vulgaris* - associatie. Tussen de struik- en dopheide groeit veel stekelbrem (*Genista anglica*) en kruipwilg. Voorts kan men er de min of meer zeldzame soorten aantreffen: welriekende nachtorchis

11

(*Platanthera bifolia*), liggende vleugeltjesbloem (*Polygala serpyllifolia*), maanvaren (*Botrychium lunaria*), rozenkransje (*Antennaria dioica*), vetblad (*Pinguicula vulgaris*), wolverlei (*Arnica montana*), boskartelblad (*Pedicularis sylvatica*), moeraswespenorchis (*Epipactis palustris*) en op de lagere, drasse plaatsen o.a. schildvruchtereprijs (*Veronica scutellata*), vleeskleurige orchis (*Orchis incarnata*), gevlekte orchis (*Orchis maculata*), moeraswolfsklauw (*Lycopodium inundatum*) en parnassia (*Parnassia palustris*).

